

**Інструкція для застосування Нукс воміка–Гомакорд**  
(розчин для ін'єкцій)

**Опис**

Розчин прозорий безбарвний.

**Склад**

1 ампула (5 мл) препарату містить діючі речовини (мг):

Bryonia D4	- 10,0;
Bryonia D6	- 10,0;
Bryonia D10	- 10,0;
Bryonia D15	- 10,0;
Bryonia D30	- 10,0;
Bryonia D200	- 10,0;
Bryonia D1000	- 10,0;
Citrullus colocynthis D5	- 15,0;
Citrullus colocynthis D10	- 15,0;
Citrullus colocynthis D30	- 15,0;
Citrullus colocynthis D200	- 15,0;
Lycoperidium clavatum D5	- 15,0;
Lycoperidium clavatum D10	- 15,0;
Lycoperidium clavatum D30	- 15,0;
Lycoperidium clavatum D200	- 15,0;
Lycoperidium clavatum D1000	- 15,0;
Strychnos nux-vomica D4	- 10,0;
Strychnos nux-vomica D10	- 10,0;
Strychnos nux-vomica D15	- 10,0;
Strychnos nux-vomica D30	- 10,0;
Strychnos nux-vomica D200	- 10,0;
Strychnos nux-vomica D1000	- 10,0.

D – ступінь потенціювання гомеопатичного інгредієнта.

Допоміжні речовини: вода для ін'єкцій, натрію хлорид.

**Фармакологічні властивості**

Дія препарату зумовлена наявністю гомеопатичних складників та принципом дії усіх гомеопатичних засобів. Препарат має спазмолітичні властивості.

**Застосування**

Лікування тварин, у комплексі терапевтичних заходів, за функціональних порушень травного каналу і печінки (розлади шлунку, гострий та хронічний гастроентерит, закрепи, хронічний та рецидивуючий метеоризм, судомні колики), судамах скелетних м'язів, патологіях міжхребцевих дисків.

**Дозування**

Застосовують внутрішньом'язово, внутрішньовенно, підшкірно, внутрішньошкірно або вводять навколо суглобів у разових дозах (для тварини, 1 раз на добу, мл):

коні, велика рогата худоба (масою тіла понад 500 кг)	- 10,0;
коні, велика рогата худоба, віслюки (масою тіла до 500 кг)	- 5,0;
свині	- 3,0-5,0;
вівці, кози	- 3,0-4,0;
собаки великих порід (масою тіла понад 25 кг)	- 3,0-4,0;
собаки середніх порід (масою тіла 15-25 кг)	- 2,0;
собаки малих порід, коти (масою тіла до 15 кг)	- 1,0-2,0;
дрібні домашні тварини	- 0,5.

За гострого перебігу захворювання препарат можна ввести повторно через 24 год.

Лікування може тривати до чотирьох тижнів.

За тривалого лікування тварин з хронічними захворюваннями разову дозу слід вводити із 1-4 добовими перервами до одужання.

**Протипоказання**

Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

**Форма випуску**

Скляні ампули, об'ємом 5 мл, по 5 або 50 шт. у блістерах, вкладені у картонні коробки.

**Зберігання**

У сухому темному місці, подалі від джерел електромагнітних випромінювань, при температурі від 15 до 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

**Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу**

Ампулу із препаратом не розрізати! Слід, тримаючи під кутом за голівку, злегка струсити для видалення препарату та відламати, натискаючи у бік від кольорової позначки. Скляні залишки від ампули викинути.

Термін придатності препарату — 5 років.

**Для застосування у ветеринарній медицині!**

**Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту**

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ  
Д-р Рекевег-штрассе 2-4,  
76532 Баден-Баден, Німеччина